

Link do produktu: <https://sklep.skleprolnika.pl/bactim-receptor-1kg-p-957.html>



Bactim Receptor 1kg

Cena **390,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

BACTIM® RECEPTOR to mikrobiologiczny preparat ograniczający szkodliwość nicieni, polecany do podlewania lub fertygacji w uprawach warzyw i roślin ozdobnych a także ziemniaków i gatunków sadowniczych. Produkt zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saprofitycznych oraz promieniowców.

Skład biopreparatu:

Glomus coronatum GU 53 - 10%
Glomus caledonium GM 24 - 10%
Glomus mosseae GP 11 - 10%
Glomus viscosum GC 41 - 10%
Rhizophagus irregularis RI 31 - 10%
Streptomyces spp. SB 14 - 8,5% 7,2 miliona ($7,2 \times 10^6$ jtk/g)
Streptomyces spp. ST 60 - 8,5% 7,2 miliona ($7,2 \times 10^6$ jtk/g)
Streptomyces avernensis SC 42 - 8,5% 7,2 miliona ($7,2 \times 10^6$ jtk/g)
Pochonia chlamydosporia PC 50 - 8,5% 7,2 miliona ($7,2 \times 10^6$ jtk/g)

Korzyści ze stosowania biopreparatu:

- ograniczenie szkodliwości nicieni
- zwiększenie odporności roślin na choroby systemu korzeniowego
- poprawa zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe oraz wodę
- polepszenie właściwości fizyko-chemicznych gleby
- poprawa wielkości i jakości plonu warzyw i owoców.

Stosowanie:

Ziemniak

- przed sadzeniem sadzeńców - oprysk gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą), 1-2 kg/ha
- przed obsypywaniem roślin - oprysk roślin i gleby, 1-2 kg/ha

Drzewa i krzewy owocowe

- w pierwszym roku stosowania - systematycznie co miesiąc, fertygacja, 1-2 kg/ha (maksymalne stężenie 10 g/100 l wody)
- w kolejnych latach stosowania - po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem, fertygacja, 1-2 kg/ha (maksymalne stężenie 10 g/100 l wody)

Cebula - uprawa w polu bez fertygacji

- przed siewem/przed sadzeniem rozsady/przed sadzeniem dymki
- oprysk gleby, dawkowanie: jednorazowa dawka 2 kg/ha, po zabiegu wykonać uprawkę mechaniczną.
- wzrost liści - do początku formowania się główki cebuli
- oprysk roślin i gleby, dawkowanie: jednorazowa dawka 2 kg/ha. Po zabiegu wykonać zabieg deszczowania.
- W przypadku braku możliwości deszczowania korzystniej jest zastosować łączną dawkę 4 kg/ha przed siewem.

Cebula - plantacje fertygowane

- wzrost liści - do początku formowania się główki cebuli
- fertygacja: 2 kg/ha/aplikację, stosować co 14-21 dni. Bactim Receptor stosować w oddzielnym cyklu fertygacyjnym.
- łączna dawka: 4 kg/ha/cykl uprawowy. Maksymalne stężenie biopreparatu: 10 g / 100 l wody (1 kg / 10 m³ wody). Zalecana ilość wody: 20-50 m³.

Cebula - zaprawianie dymki

Zabieg szczególnie polecany w przypadku uprawy na stanowiskach narażonych na występowanie nicieni.

- moczenie dymki przez 15 minut w roztworze o stężeniu 0,5%.

Czosnek - uprawa w polu bez fertygacji

- przed sadzeniem ząbków czosnku
jednorazowa dawka 2 kg/ha, oprysk gleby, po zabiegu wykonać uprawkę mechaniczną.
- po wschodach
jednorazowa dawka 2 kg/ha, oprysk roślin i gleby, po zabiegu wykonać deszczowanie.
- początek formowania się główki czosnku
jednorazowa dawka 2 kg/ha, oprysk roślin i gleby, po zabiegu wykonać deszczowanie.

Czosnek - plantacje fertygowane

- wzrost liści – do początku formowania się główki czosnku
fertygacja 2 kg/ha/aplikację, stosować co 14–21 dni. Bactim Receptor stosować w oddzielnym cyklu fertygacyjnym.
Łączna dawka: 6 kg/ha/cykl uprawowy, maksymalne stężenie biopreparatu: 10 g / 100 l wody (1 kg / 10 m³ wody), zalecana ilość wody: 20–50 m³.

Czosnek - zaprawianie ząbków czosnku

- przed sadzeniem ząbków czosnku
moczenie ząbków czosnku przez 15 minut w roztworze o stężeniu 0,5%.

Por - w polu bez fertygacji

- przed sadzeniem rozsady / przed siewem
oprysk gleby w dawce 2 kg/ha, po zabiegu wykonać uprawkę mechaniczną.
- początkowy wzrost roślin
oprysk roślin i gleby w dawce 2 kg/ha, po zabiegu wykonać zabieg deszczowania.
W przypadku braku możliwości deszczowania korzystniej jest zastosować łączną dawkę 4 kg/ha przed sadzeniem rozsady / siewem nasion.

Por - plantacje fertygowane

- początkowy wzrost roślin
fertygacja 2 kg/ha/aplikację, stosować co 14–21 dni. Bactim Receptor stosować w oddzielnym cyklu fertygacyjnym.
Łączna dawka: 4 kg/ha/cykl uprawowy, maksymalne stężenie biopreparatu: 10 g / 100 l wody (1 kg / 10 m³ wody), zalecana ilość wody 20–50 m³.

Marchew, Pietruszka, Pasternak

- przed formowaniem redlin
oprysk gleby w dawce 1-2 kg/ha, po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą.
- korzenie zaczynają się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 41–43)
oprysk roślin i gleby w dawce 1-2 kg/ha, zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem, w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu w celu splukania mikroorganizmów z roślin do gleby.

Seler

- produkcja rozsady: faza 3.–4. liścia
podlewanie roślin roztwór 0,2–0,5%
- przed wysadzeniem rozsady
oprysk gleby w dawce 1-2 kg/ha, po aplikacji biopreparat płytko wymieszać z glebą lub wykonać deszczowanie
- uprawa w gruncie: faza 7. liścia – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 17–42)
oprysk roślin i gleby w dawce 1-2 kg/ha, zabieg wykonać przed spodziewanym deszczem, w czasie deszczu lub zdeszczować pole po zastosowaniu biopreparatu w celu splukania mikroorganizmów z roślin do gleby.

Burak Cwikłowy

- przed siewem nasion
oprysk gleby w dawce 1–2 kg/ha, po aplikacji biopreparat płytko wymieszać z glebą.

Przed użyciem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją stosowania znajdującą się na opakowaniu.

W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2020 poz. 2097 ze zm.) oraz Rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2020 poz. 2097 ze zm.).