

Link do produktu: <https://sklep.skleprolnika.pl/vitaexpert-stress-control-5l-p-935.html>

VitaExpert Stress Control 5l

Cena **130,00 zł**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

VitaExpert Stress Control - pogromca stresu abiotycznego związanego z suszą, wysokimi temperaturami i promieniowaniem UV.

Biostymulator zawierający Proline (L-aminokwas), zwiększa odporność roślin i przetrzymuje stres związany z suszą, wysokimi temperaturami i promieniowaniem UV, doskonale odżywia rośliny, poprawia plonowanie, silnie wzmacnia system korzeniowy.

Produkt o wysokim stopniu koncentracji potasu zawierający liczne L- aminokwasy roślinne oraz zwiększony udział proliny. Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego ułatwiając tym samym pobieranie składników pokarmowych i wody w okresie suszy. Dodatek proliny regulujący funkcje osmozy wpływa korzystnie na gospodarkę wodną rośliny. Aplikacja przed kwitnieniem poprawi żywotność i plenność pyłku kwiatowego. To pozwala osiągnąć wysokie plony o doskonałej jakości. Może być stosowany w celu szybkiego uzupełnienia niedoborów składników pokarmowych. Zaleca się prewencyjny zabieg przed spodziewanym wystąpieniem stresu abiotycznego (okresowa susza, wysokie temperatury, wysokie promieniowanie UV). Szczególnie polecany do upraw, które charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na potas.

Skład:		
MAKROELEMENTY	% wag.	% obj.
Azot (N)	10,50	15,54
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅)	5,00	7,40
Tlenek potasu (K ₂ O)	25,00	37,00
Węgiel organiczny (C)	20,00	29,60
MIKROELEMENTY	% wag.	% obj.
Bor (B)	0,035	0,051
Miedź (Cu)	0,040	0,059
Żelazo (Fe)	0,100	0,148
Mangan (Mn)	0,015	0,022
Molibden (Mo)	0,007	0,010
Cynk (Zn)	0,035	0,520

Dawki i terminy stosowania:

Uprawa	Dawka (l/ha)	Liczba i Terminy Zabiegów
Zboża ozime	0,5-1,5	1 zabieg jesienny od fazy 4 liścia (nie później niż 3 - 4 tygodnie przed zimową przerwą wegetacji), 2 zabiegi wiosenne: od wiosennego ruszenia wegetacji do początku kłoszenia, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni
Rzepak ozimy	1-2	1 zabieg jesienny od fazy 4 liścia (nie później niż 3 -4 tygodnie przed zimową przerwą wegetacji), 2 zabiegi wiosenne: od wiosennego ruszenia wegetacji do początku rozwoju pąków kwiatowych, odstęp między zabiegami co najmniej 10-14 dni
Zboża jare	0,5-1,5	2 zabiegi od fazy 3-4 do początku kłoszenia, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni
Buraki cukrowe	1-2	2-3 zabiegi od fazy 4-6 liścia do 100% zwiarcia międzyrzędzi, odstęp między zabiegami co najmniej 10-14 dni
Ziemniaki	0,5-1	2-3 zabiegi od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw, odstęp między zabiegami co najmniej 10-14 dni
Warzywa	1-2 (3*)	od fazy 4 liścia, w okresie intensywnego wzrostu, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni
Sady i jagodniki	2-3(5*)	5 -6 zabiegów od fazy zielonego pąka oraz po kwitnieniu, odstęp między zabiegami co

najmniej 10 -14 dni

Ilość cieczy roboczej 150 -300l/ha. Fertygacja: 0,25%. (*) w przypadku znacznych niedoborów składników pokarmowych.