



VitaFer Algi 5l

Cena **140,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Mineralny nawóz biostymulujący z zawartością makro i mikrośladników oraz wyciągu z alg morskich „Ascophyllum Nodosum”
Zawiera: 3,08% N + 1,85% K₂O + 0,25 SO₃ + 0,17% CaO + mikroelementy + wyciąg z alg morskich Ascophyllum Nodosum + naturalne hormony wzrostu + aminokwasy + witaminy + jod + adiuwanty + EPIN
Gęstość: 1,23 kg/l pH: 5,0 - 6,5

Vitafer Algi zalecany jest do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki - stresy fizjologiczne np. gradobicie, susza - oraz wpływy patogenów. Wspomaga proces regeneracji roślin, co minimalizuje straty w plonach.

Dawki i terminy stosowania

| Uprawa | Liczba zabiegów | Dawka l/ha | Terminy zabiegów |
|----------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burak cukrowy | 1 | 2-3 | od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39) |
| Drzewa pestkowe | 2 | 2-3 | pierwszy – od początku kwitnienia do opadania płatków (BBCH 51-69), drugi – po pierwszym opadaniu zawiązków (BBCH 69-81) |
| Drzewa ziarnkowe | 3 | 2-3 | w okresie kwitnienia oraz wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 51-89) |
| Kukurydza | 1 | 2-3 | w fazie 4 – 8 liści (BBCH 14-18) |
| Marchew, cebula, por, rzepa | 2 | 2-3 | pierwszy – od fazy 4 liścia (BBCH 14-16), następny – po 14 dniach |
| Pomidory, ogórki, papryka, dynia | 2 | 2-3 | pierwszy – na początku kwitnienia (BBCH 40), następny – po 14 dniach |
| Rzepak | 2-3 | 2-3 | jesienią: jeden zabieg od fazy 6-8 liści (BBCH 16-25), wiosną: 1-2 zabiegi od początku wydłużania pędu głównego zaraz po spoczynku zimowym, do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-52) |
| Truskawka | 2 | 2-3 | pierwszy: tuż po rozpoczęciu wegetacji ale przed kwitnieniem (BBCH 10-49), drugi: od pęknięcia pierwszych pąków do zawiązywania owoców (BBCH 60-81) |
| Winorośl | 2 | 3 | pierwszy: od fazy 5-6 liści do pęknięcia pąków (BBCH 14-55), drugi: od zawiązywania owoców do końca ich rozwoju (BBCH 71-89) |
| Zboża | 3 | 2-3 | jesienią: jeden zabieg od fazy 3 liści (BBCH 13-25), wiosną: 2 zabiegi po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31-50) |

Nawożenie przez systemy fertygacyjne: dla wszystkich upraw stosować roztwór o stężeniu 0,25% w momencie intensywnego wzrostu.